



आरोग्य सेवा संचालनालय
(महाराष्ट्र राज्य)



" आरोग्य भवन ", सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, पी.डिमेंलो रोड, मुंबई- ४००

कार्यालय संचालक (वैयक्तिक)	दूरध्वनी २२६२१०३१-३६ २२६२१००६	Website : http://arogya.maharashtra.gov.in Email : dhs_2005@rediffmail.com Email : dhs_epi@rediffmail.com Fax No. 022- 22620234 (DHS)
	क्र.:संआसे/साथरोग/स्वाइन फ्लू मार्गदर्शक सूचना/ कक्ष-६/ २८७२-८७ /१५.दिनांक :२३.०७.२०१५.	

प्रति,

- १) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये, पुणे/नागपूर/नाशिक/लातूर/औरंगाबाद.
- २) कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.

विषय:- तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांना इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना

संदर्भ:- महाराष्ट्र साथरोग प्रतिबंध व नियंत्रण तांत्रिक समितीची बैठक दि.२० जुलै २०१५ मध्ये देण्यात आलेल्या सूचना.

सन २००९ साली पॅन्डेमिक इन्फ्ल्यूएन्झा ए एच१ एन१ च्या उदयानंतर महाराष्ट्रात दरवर्षी ठळक स्वरूपात फ्लू रुग्ण आढळत आहेत. फ्लूमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्या रुग्णांची संख्याही लक्षणीय आहे. राज्यातील साथरोग परिस्थितीसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ७ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र साथरोग प्रतिबंध व नियंत्रण तांत्रिक समितीची स्थापना केली. या समितीने स्वाइन फ्लूमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये गरोदर मातांचे प्रमाण लक्षणीय आहे हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांना इन्फ्ल्यूएन्झा प्रतिबंधात्मक लस मोफत उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात गरोदर मातांचे हे लसीकरण राज्यातील ६ शहरांमध्ये निश्चित केलेल्या लसीकरण केंद्रांच्या ठिकाणी करण्यात येईल. याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे -

अ.क्र.	शहर	इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण केंद्र
१	मुंबई	कस्तुरबा रुग्णालय, मुंबई
२	पुणे	जिल्हा रुग्णालय, पुणे
३	नाशिक	जिल्हा रुग्णालय, नाशिक
४	औरंगाबाद	शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय, औरंगाबाद
५	लातूर	स्त्री रुग्णालय, लातूर
६	नागपूर	डागा रुग्णालय, नागपूर

इन्फ्ल्यूएन्झा लसीचा प्रकार व माहिती -

इंजेक्शनद्वारे द्यावयाची इन्फ्ल्यूएन्झा लस (ट्रायवॅलेंट इनअॅक्टिवेटेड इन्फ्ल्यूएन्झा व्हॅक्सीन)

इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण मोहिमेसाठी पुरविण्यात आलेली लस इन्फ्ल्यूएन्झा विषाणूच्या इन्फ्ल्यूएन्झा ए प्रकारातील दोन उपजाती, एच १ एन१ व एच३ एन२ तसेच इन्फ्ल्यूएन्झा बी विषाणूविरुद्ध कार्य करते.

ही लस इन्फ्ल्यूएन्झाच्या तीन उपजातीविरुद्ध (इन्फ्ल्यूएन्झा ए एच१ एन१, इन्फ्ल्यूएन्झा ए एच३ एन२ आणि इन्फ्ल्यूएन्झा बी) गुणकारी आहे.

वातावरणातील इन्फ्ल्यूएन्झा विषाणू आणि लसीमध्ये वापरण्यात आलेला विषाणू यांच्यात जनुकीय साम्य असल्यास ही लस ७० - ९० % उपयुक्त ठरते.

ही लस घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या शरीरात इन्फ्ल्यूएन्झा विरोधी प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यास किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागतो. याप्रकारे मिळालेली प्रतिकार शक्ती अधिकात अधिक एक वर्षापर्यंत टिकू शकते. त्यामुळे हे लसीकरण दरवर्षी घेणे आवश्यक ठरते.

इन्फ्ल्यूएन्झा रुग्ण मुख्यत्वे ऑगस्ट-सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीमध्ये आढळत असल्याने जुलै महिन्यात लस घेतल्यास येणाऱ्या दोन्हीही इन्फ्ल्यूएन्झा सिझनमध्ये फ्ल्यू आजारापासून संरक्षण मिळते.

लस कशी द्यावी ?

इन्फ्ल्यूएन्झा लस ही सिंगल डोस प्री फिल्ड सिरिंज स्वरूपात पुरविण्यात आली आहे. लसीचा डोस ०.५ मिली आहे. ही लस गरोदर मातेस इन्ट्रामस्क्युलर देण्यात यावी. मातेला धनुर्वात प्रतिबंधक लस द्यावयाची असल्यास या दोन लशी वेगवेगळ्या ठिकाणी (वेगवेगळ्या हाताला) देण्यात याव्यात.

लसीचा साठा कसा करावा ?

ही लस आय.एल.आर. मध्ये २° ते ८° सेल्सिअस तापमानामध्ये ठेवावी. सदरची लस कोणत्याही परिस्थितीत डीप फ्रिजरमध्ये ठेवू नये.

लस देताना घ्यावयाची दक्षता -

- लसीमध्ये असलेल्या क्रियाशील घटकाची अॅलर्जी असलेल्या व्यक्तींना ही लस देऊ नये
- लसीकरण लाभार्थीस ताप अथवा संसर्गाची लक्षणे असल्यास अशा व्यक्तीचे लसीकरण ती व्यक्ती पूर्णपणे बरी होईपर्यंत पुढे ढकलावे.
- लसीकरण लाभार्थीनी आपण घेत असलेल्या अथवा नुकत्याच घेतलेल्या औषधांची /इतर लसींची माहिती देणे आवश्यक आहे.
- लसीकरण लाभार्थी स्टिरॉईडस् अथवा सायटोटॉक्सिक औषधे घेत असेल तर प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

लसीकरणानंतर उदभवणाऱ्या प्रतिक्रिया -

लसीकरणानंतर काही व्यक्तींना सर्वसाधारण पुढील प्रतिक्रिया उदभवू शकतात.

- ✓ डोकेदुखी.
- ✓ घाम येणे.
- ✓ स्नायू अथवा सांध्यांमध्ये वेदना.
- ✓ ताप, बरे न वाटणे, थंडी वाजणे, थकवा.
- ✓ स्थानिक प्रतिक्रिया - लसीकरण दिल्याचे जागी व अवतीभोवती लालसरपणा, सूज, वेदना.

सर्वसाधारणपणे या प्रतिक्रिया उपचाराशिवायही एक ते दोन दिवसात कमी होतात. या सर्वसामान्य प्रतिक्रियांशिवाय काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये गंभीर स्वरूपाची अॅलर्जिक प्रतिक्रिया, गिया बारी सिंड्रोम, रक्तपेशी कमी होणे अथवा इतर प्रतिक्रियाही आढळू

शकतात. अधिक माहितीसाठी लसीसोबत उत्पादकाने दिलेल्या माहितीपत्रकाचा अभ्यास करावा.

नियमित लसीकरणाप्रमाणेच इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरणानंतर उदभवणाऱ्या प्रतिक्रियांची (ए.ई.एफ.आय.) माहिती या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या प्रपत्रामध्ये राज्य तसेच केंद्र सरकारला कळविणे बंधनकारक आहे, याची नोंद घ्यावी.

गरोदर माता इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण - कार्यपद्धती -

- लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील ६ शहरांमधील केवळ तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांना लसीकरण करण्यात येईल.
- ही शहरे ज्या जिल्हा शल्य चिकित्सकाच्या अधिनस्त आहेत त्यांच्याकडे लसीचा साठा देण्यात येईल.
- या शहरातील निवडलेल्या रुग्णालयामध्ये गरोदर माता लसीकरणासाठी ए.एन.सी. क्लिनिकच्या ठिकाणी वेगळा लसीकरण काउंटर उघडावा. या लसीकरण काउंटरच्या ठिकाणी दर्शनी भागात " गरोदर मातांसाठी (तिसऱ्या तिमाहीतील) ऐच्छिक स्वाइन फ्ल्यू लसीकरण केंद्र " असा ठळक फलक लावावा.
- हे तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांसाठीचे ऐच्छिक स्वाइन फ्ल्यू लसीकरण केंद्र ए.एन.सी तपासणीच्या दिवशी सुरु ठेवावे.
- या लसीकरण केंद्रावर लसीकरणासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नेमणूक करावी. रुग्णालयातील सक्षम वैद्यकिय अधिकाऱ्यास या लसीकरण केंद्राचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करावे. लसीचे प्रशिक्षण सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हि.ह व ज.रो.) पुणे यांचेमार्फत देण्यात येईल. या प्रशिक्षणानंतरच लसीकरण सुरु करावे.
- प्रत्येक रुग्णालयाने लस नोंदणीसाठी खालील पद्धतीचा अवलंब करावा.
 - १) गरोदर मातेची लसीकरण नोंदणी - गरोदर मातेच्या ए.एन.सी. कार्डवर फ्ल्यू लसीकरणाची नोंदणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे शिक्का तयार करावा.

INFLUENZA IMMUNISATION	
Date	ANC Weeks
Name of Manufacturer	
Batch No.	
Date of Mfg.	Date of Expiry
लसीकरणानंतर काही त्रास झाल्यास खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा.	
फोन नंबर-	

लसीकरणानंतर वरील शिक्क्यावर सर्व माहिती व्यवस्थित भरावी.

- २) लसीकरण झाल्यावर एखाद्या मातेस काही त्रास झाल्यास संपर्क साधण्यासाठी शिक्क्यावर लसीकरण केंद्राच्या प्रमुख वैद्यकिय अधिकाऱ्याचा फोन नंबर देण्यात यावा. त्याची माहिती सर्व लसीकरण लाभार्थींना द्यावी.
- ३) परिशिष्ट- ३ मध्ये दिलेले संदेश लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी दर्शनी भागात लावावेत.

- इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरणासाठी आलेल्या लाभार्थींची माहिती वेगळ्या रजिस्टरमध्ये नोंदवावी. नोंदणी प्रपत्र परिशिष्ट - १ मध्ये जोडले आहे.
- लसीकरणाचा दैनंदिन अहवाल जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून उपसंचालकामार्फत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांना सादर करण्यात येईल. लसीकरण दैनंदिन अहवाल प्रपत्र परिशिष्ट - २ मध्ये देण्यात आले आहे.
- लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी संभाव्य प्रतिक्रियावर उपचार देण्यासाठी इमर्जन्सी ट्रे तयार ठेवावा तसेच तातडीच्या रुग्ण व्यवस्थापनाकरीता आवश्यक साधने व उपकरणे उपलब्ध ठेवावीत.
- लस दिल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या सिरिंजेस आणि इतर बाबींची जैव वैद्यकिय कचरा व्यवस्थापन नियमावली नुसार विल्हेवाट लावावी.

वर दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आपण आपल्या कार्यक्षेत्रातील तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर माता इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. या मोहिमेसंदर्भात आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे जनजागृती करावी. मोहिमेचा दैनंदिन अहवाल jdsh@rediffmail.com आणि pulsepolio@gmail.com या ई-मेल वर रोज संध्याकाळी ५.०० वाजता सादर करावा.

संचालक, आरोग्य सेवा,
मुंबई.

प्रत योग्य त्या कार्यवाहीस्तव -

- १) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळे, ठाणे/पुणे/नागपूर/नाशिक/लातूर/औरंगाबाद
२/-आपल्या विभागातील इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण मोहिमेचे नियोजन व अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांनुसार होईल याकरिता व्यक्तिशः लक्ष द्यावे.
- २) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हि.ह.व ज.रो.)पुणे.
- ३) अतिरिक्त संचालक, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य पुणे.
२/-लसीकरण हा विषय आपल्या विभागाशी संबंधित असल्याने इन्फ्ल्यूएन्झा लसीकरण मोहिमेबाबत आपल्या स्तरावरून या मोहिमेचे संनियंत्रण व पर्यवेक्षण केले जावे.

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर -

डॉ.सुभाष साळुंके, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साथरोग प्रतिबंध व नियंत्रण तांत्रिक समिती.
मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

नोंदवही प्रपत्र

दिनांक		लसीकरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव	१	
			२	
			३	
रुग्णालयाचे नाव				
लसीची माहिती				
कंपनीचे नाव		लसीचे मिळालेले एकूण डोस		
बॅच नंबर		लसीचे वापरलेले डोस		
निर्मिती तारीख		परत करण्यात आलेले लसीचे डोस		
मुदतबाहय तारीख				

[illegible]

परिशिष्ट - २
ऐच्छिक इन्फल्यूएन्झा लसीकरण अहवाल.

दिनांक -

रुग्णालयाचे नाव व पत्ता -

दैनंदिन			प्रगतीपर			लसीचा हिशोब		
फल्यू लसीकरणासाठी आलेल्या गरोदर माता	फल्यू लसीकरण दिलेल्या गरोदर माता	लसीकरणानंतर प्रतिक्रिया उदभवलेल्या गरोदर माता	फल्यू लसीकरणासाठी आलेल्या गरोदर माता	फल्यू लसीकरण दिलेल्या गरोदर माता	लसीकरणानंतर प्रतिक्रिया उदभवलेल्या गरोदर माता	एकूण उपलब्ध डोस	आजपर्यंत वापरलेले लसीचे डोस	आज अखेर शिल्लक लस डोस

परिशिष्ट - ३

इन्फल्यूएन्झा लसीकरणासाठी येणाऱ्या लाभार्थींना द्यावयाची माहिती.

- १) फल्यू आजार तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांमध्ये गंभीर स्वरूप धारण करतो, त्यामुळे त्यांनी ही लस घेणे लाभदायक आहे.
- २) फल्यू लसीकरण हे पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे.
- ३) या लसीचा गर्भावर विपरीत परिणाम होत नाही.
- ४) ही लस त्रिगुणी असून ती फल्यूच्या तीन प्रकारच्या उपजातीविरुद्ध आहे.
- ५) ही लस घेतल्यानंतर फल्यू विरोधी प्रतिकारशक्ती तयार होण्यास किमान २ आठवड्यांचा काळ लागतो.
- ६) या लसीमुळे मिळणारी प्रतिकारशक्ती ८ महिने ते एक वर्षापर्यंत टिकते.
- ७) फल्यू टाळण्यासाठी फल्यू विरोधी लसीकरणाचा फायदा होतो हे खरे असले तरीही ही लस घेऊनही काही व्यक्तींना फल्यू होऊ शकतो.
- ८) या लसीमुळे काही जणांना ताप येणे, थकवा, अॅलर्जी, इंजेक्शनच्या जागी सूज येणे, अंग खाजविणे अथवा इतर प्रकारचा त्रास होऊ शकतो.